

## 葉勁秋編

檢食前尿道淋與後尿道淋之法。應先備雙杯二只。令病人排尿于杯中。前杯所盛之尿曰前尿。後杯所盛之尿曰後尿。通常相應于疾病。而表示其瀉濁狀態如下。

卷之四

**愛情障得**

愛香惡臭——人之恆情  
憂情淚涕——理所當然  
鼻清破涕——其惟保福  
地獄之鎖——其惟保福

小程育心鴛鴦本場著名之  
致慶與鳳凰——其日膳過  
久慕無波——其結夫流涕度  
入妻愛惜求產之期兩君名  
有友無兒見報無上意載中  
服有二孫可治病急效購  
愛好如初宿願果效夫妻  
受賜九意不折之效每盒大洋

愚齋詩草

愚盒詩草

爲本社特約編輯余不平君

所著。昔袁子才韻作詩貴有靈性。余君之詩。當之無愧。全書一冊。附有作者銅版小影二張。定價三角。實售七折。

郵費在內。

上海雲南路安康里  
醫界春秋社江蘇滬  
安蘇林市余不平君  
江蘇阜南大門外  
振華書局

售書處

樂 士 御 本

朱振聲  
例

(乙)門診一元 貧病減半  
(丙)出診四元 路途遙加  
(丁)膏丸方四元 次日取件  
(戊)急病隨請隨到

出時午至九  
 時診止四下時午診  
 弄第業路其上  
 第一里會南海  
 三九四三六路電  
 啓處號掛

幸福報

鈇儀署

第一七六期  
 (日八十月一年九十國民)  
 每份售洋二分  
 口路南雲路馬三海上址館  
 定報價目  
 本埠每月一元  
 外埠每月一元二角  
 廣告價目  
 第一版每行一元  
 第二版每行八角  
 第三版每行六角  
 第四版每行四角  
 第五版每行三角  
 第六版每行二角  
 第七版每行一角  
 第八版每行八分  
 第九版每行六分  
 第十版每行四分  
 第十一版每行二分  
 第十二版每行一分

為父母者應具的醫藥常識

小兒驚風症最宜注意之一點

(二)小兒百種病中，占感冒食滯的。約有九十。

(二)治療小兒驚風。首宜消其食滯。治其感冒。不可妄用鎮驚散風劑。

吐血與肺癆

宋病者讀之  
可知預防之法  
已病者讀之  
可謀挽救之策  
疑似者讀之  
可以煥然冰釋  
醫學家讀之  
可知治療正軌

故本書出版以來。風行遐邇。以其書中語語精切。有益實用也。

每冊實洋兩角

郵費代現通用

上海三馬路 幸福報館發行

但是有時候，父母也會殺了他的兒子。咽喉。你不是很明白這嗎？怎麼父母就會殺他兒子呢。其中却有個解脫。就是做父母殺了他的兒子，是無意的。不是有意的。是出於愛而殺他兒子的。不是出於惡而殺他兒子的。

▲做父母的。殺他兒子。尤其是以驚風症爲最多。因爲驚風症。角弓反張的那種樣子。怕人來些。所以往往一點鐘裏。能請了幾個醫生。這個說。是驚嚇出來的。那個說。是因風而得的。這個用了一服驚驚藥。那個用了一帖散風丹。沒有一刻的。那第三個醫生來了。先把單子一看。再把小孩一診。大罵道。他這逆症。的虛實寒熱。都分不出來。亂來用藥。非用我祖傳秘製的萬應鎮驚丹不可了。但是吃了下去。不一刻。兩目失神。痰涎如銀。漸漸的安靜異常。他的父母。便是哭叫了萬聲。他也不應。

（未完）



大風風古名廣風。亦曰癩病。皆由癩菌傳染而發。乃一種頑惡性慢性之傳染病也。此病蔓延最廣區域。則推我國日本發症時期。以二十歲以上四十歲以下爲尤多其潛伏期可延長多年。亦有至三四十一年之久者。惟短促之潛伏期。間亦有之。總而言之。皆以自身抵抗力之強弱爲別。凡人染受此症。雖不能確實證明受病之在何時。然其先驅症狀。往往以頭面汗癢而始。此外則四肢發癢。並時覺充風。(即風)癢如蟲行並覺熾熱者是。)全身倦怠。是乃廣風症之候表。麻風之主要病。有表皮性癩與神經性癩之分。而表皮性癩又有結節癩斑紋癩等號。皆以症狀之現象而異其名耳。治法却無殊殊。表皮性癩者。處處皮膚先現紅斑。或線狀。更迭不止。其隱處。隨變褐色。或對白之色。同時皮膚粗糙。或廣汎而靡定。或限局如結節。或蓋風風桿菌。侵入皮下肌質間。而起細胞反應。遂致細胞肥厚。此癩之皮膚。能復舊觀者極少。如在面部。咽喉腫。自眼緣耳投以范魯昔兩因。

原不損其廣表。故有獅子貌稱。其發症變厚之部。感覺逐漸就麻痺。試以草尖或羽毛輕觸之。感覺必不如他部之敏。久則痛覺溫覺。終至消失。其浸潤處漸分解膿化爲潰瘍。有無數掣狀面。由傷口流出。又甚則癩菌侵入黏膜。(鼻黏膜爲最早)漸波及咽喉。並蔓延至深部。鼻腔咽道。因而狹窄。聲音嘶啞。終至無聲。甚至鼻軟骨骨亦串孔潰爛。古人所謂肺風。蓋以此得名也。

(未完)

**續銀海新編** 二  
加減駐景尤 坐起生花精氣  
虧，加味駐景熟地歸，五味杞  
兔事精實，川椒去目鹽酒隨。  
**重霧移晴**  
雲霧移晴。元虛者歿。自視目外  
。有物舒張。或如蠅蛇飛伏。  
或如旗幡飄揚。有如粉蝶。有  
帶青黃。皆屬肝腎。內癰癰瘡  
。精氣耗損。精汁有傷。自宜  
謹慎。思患須防。  
此症自見目外，有此等狀  
，仰視則上，俯視則下，  
覺滑清純，乃虛弱之人，  
及經產去血太多，或經滯  
太過，深思積忿之婦女，  
每有此患，  
(未完)

燕窩小談  
(下)

性質。甘淡平無毒。

功用益氣和中。調肺。開胃。化痰。止咳。添精。補髓。陽。治肺氣。(入梨和冰糖蒸食)痰喘。(秋白梨去心。入燕窩  
先用熱水泡泡。再入冰糖蒸熟。每日早晨食之。(小便秘  
血痢。勞痢。噤口痢。(取白者。同人參用水隔湯燉熟。食  
後食之。(小兒痘瘡。入煎藥用。或單煮汁服。)

**雜論** 燕窩粉作窩。得風日陽和之氣。化寒凝爲甘平。能使金  
水相生。腎氣上滋於肺。而胃氣亦得以安。故能大養肺陰。化  
痰止咳。補而能降。爲調理虛損勞瘵之聖藥。一切病之由於肺  
虛不能清肺下行者。用此皆可治之。今人以之調補虛勞血氣之  
和水糖煎飲。往往獲效。(二說今人用以煮粥。或兼升氣之  
。雖味甚可口。然亂其清補之本性。豈能已疾。如與冰糖同煮  
。則甘味更滯。亦足助熱生火。不能助肺金清肅下行。(然惟  
病勢初淺者爲宜。若體火方盛。血逆上奔。亦無所濟。以其物  
性無剛毅之力也。又凡暴得欬嗽。吐血不止。以冰糖煎。此物  
蓋遲緩。取其平補肺肺。而無止截之患。惟胃中有痰涎者。同  
人啖粥。以其平甜膩解也。再一研微黑而多毛。爲棧運時所遺  
者。法證人常服。亦能潤肺止咳。功同參苓。(却謂)

口癰瘋論治

痢瘕爲難治之證。因其根蒂最深。〔論者〕聞此病得於先天未降生之時。故不易治耳。愚平素對於此證。有單用磨刀水治者。有單用熊胆愈者。有單用蘆薈治愈者。有用加味磁石丸治愈者。〔方載東中參西錄第七卷〕有日效西藥吳興剏抱水瀉拉拉魯藥。強制其腸筋。使不暴發。有徐以健脾胃痰消火鎮寧之藥治愈者。然諸如此治法。用者固多。不效者亦間有之。仍覺得於此證。平有把握。後治天小西邊門外王氏婦。年近三十旬得此瘋症。醫治年餘不愈。寢至每日必發。且病勢較重。其病甫發時作狂笑。繼則肢體抽掣。昏不知人。脈象滑實。關前尤甚。知其痰火充盛上併於心不守舍。故作狂笑。痰火上併不已。上迫腦筋筋失其所司。故抽掣失其知覺也。先投以滋痰〔方載東中參西錄第三卷係生豬石細末二兩大黃一兩朴硝六錢。清半夏四錢各三錢〕開日一劑。三劑後病勢稍輕。遂改用丸藥。礞化丸。生豬石朴硝各二兩硃砂青黛各一兩。黃丹六錢。復用生豬石細末四兩。爲細末焙透熱調以藥茶中。煉蜜爲丸二錢重。當空心時開水送服一丸。日兩次。服至百丸全愈。又治奉天女師範學生劉仲生。素患痢瘕。十餘日一發。愚曾用羚羊角加清火理痰鎮肝之藥治愈。隔二年証又反。再投以前方不效。亦異以此丸。服盡六十九全愈。

（未完）

之研究  
(上)

行並覺燒灼者是。<sup>一</sup>。全身倦怠。是乃麻風症之候矣。

麻風之主要證。有表皮性類與神經性之分別。有表皮性類與有結節瘡斑被類等號。皆以症狀之現象而異其名耳。治法却無其殊。表皮性類者。處處皮膚先現紅斑。此隱彼現。更迭不止。其隱滅處。隨變褐色。或成鮮白色。同時皮膚癢癢。或廣汎而靡定。或限局如結節。或麻風桿菌。侵入皮下肌實質間。而起細胞增殖。遂致細胞肥厚。此變厚之皮膚。能復舊觀者極少。如在面部。硬變既久。自眼緣耳後以迄鼻唇兩側。靡不增其廣度。故有獅子貌之稱。其發此變厚之部。感覺覺漸就麻痺。試以厚草末或羽毛輕觸之。或覺不如他部之敏。又久則痛覺溫覺。終至消失。其變潤處漸分解膿化爲潰瘍。有無數瘡狀面。由傷口流出。又止其則瘡面侵入黏膜。<sup>二</sup>（鼻黏膜爲最早）漸波及咽喉。並蔓延至肺部。鼻腔氣道。因而狹窄。聲音嘶嘎。終至無聲。甚至鼻軟骨壁亦串孔潰爛。古人所謂肺風。蓋以此得名也。

（未完）